

| 香蕉 | 推薦藥劑 | 商品名 | 作用機制 | 系統性 | P/C/E | 安全採收期 | 施藥方法 | 備註 |
|------|---------|----------|-------|-----|-------|---|---|---|
| 病蟲害 | 戴尼脛 | 四季紅/四季安 | 29 | 局部 | × | 18 | 於花苞出現未開放前開始施藥，每隔5-7天施藥一次，連續三 | 適用於花薊馬。具呼吸中等毒，嚴重眼刺激性及中度皮膚刺激性。 |
| | 第滅寧 | 大禧精/達毒 | × | × | × | 6 | 於花苞出現未開放前，每隔5天施藥一次。 | 對水生生物劇毒，對蜜蜂具危害。適用於花薊馬。在香蕉結果前停止施藥。 |
| 薊馬類 | 畢芬寧 | 治多星/蟲蝦無 | 3A | × | × | 9 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 賽洛寧 | 功夫/蟲真驚 | × | × | × | 9 | 害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 益達胺 | 聯掌/織布衫 | 4A | ✓ | ✓ | 12 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 可丁丁 | 北海小英雄/允強 | × | ✓ | ✓ | 10 | 害蟲發生時，每隔7天施藥一次。 | 對蜜蜂有劇毒性。延伸使用藥劑。 |
| | 賜諾特 | 遠禮菜園寶 | 5 | × | × | 12 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| 介殼蟲類 | 達特南 | 蝦金剛/銅蝦人 | 4A | ✓ | ✓ | 10 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 亞滅培 | 強必勇/特勇 | × | ✓ | ✓ | 7 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 賜派滅 | 頭奮好/好頭板 | 23 | ✓ | ✓ | 10 | 害蟲發生時全株均勻施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 陶斯松 | 好伴伴/興時木 | 1B | × | × | 15 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 三落松 | 蟲落/易利松 | × | × | × | 14 | 害蟲發生時施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| 蚜蟲類 | 連殺蟲 | 金適配/好到陣 | 4C | × | × | 14 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次，最多二次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 賽達安 | 果來特/好賽雷 | 4A | ✓ | ✓ | 21 | 害蟲發生時，每隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| 炭疽病 | 百克敏 | 總司令/出頭天 | C3 | 局部 | P/C | 12 | 病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次。 | 變更安全劑型。 |
| | 亞托敏 | 護您水/派頭 | × | × | P | 18 | 開花初期施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 亞托敏 | 旺天下/稱興農 | × | ✓ | P/C/E | 12 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 待克利 | 農好強/巧是猛 | G1 | ✓ | P/C | 6 | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 待克利 | 獲達多/滅炭 | × | ✓ | P/C/E | 6 | 開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 亞托派瑞 | 蓋炭白 | C3/C2 | ✓ | P/C | 18 | 謝花初期開始施藥，必要時隔14天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 亞托待克利 | 尚蓋讚/好加讚 | C3/G1 | ✓ | P/C/E | 21 | 開花初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次；接著每隔14天施藥一次，至套袋為止。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 甲基多保 | 保利泰/多福淨 | B1 | ✓ | P/C | 6 | 開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 克熱淨 | 雙頭鷹 | M | × | P | 21 | 開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 克得爛 | 抗病 | × | × | P | 21 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| 黑星病 | 賽普護汰 | 速成/蓋威 | D1/E2 | ✓ | P/C | 12 | 開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 |
| | 百克敏 | 總司令/出頭天 | 局部 | 局部 | P/C | 3 | 以動力微粒噴霧器將藥劑噴射於香蕉心葉及其他葉片，每隔14天噴一次，連續三次。 | 具口服呼吸中等毒性、對眼及皮膚具刺激性。對水生生物劇毒，勿使用於「飲用水取水口一定距離內之地區」。 |
| | 亞托敏 | 旺天下/稱興農 | C3 | ✓ | P/C/E | 12 | 以動力微粒噴霧器將藥劑噴射於香蕉心葉及其他葉片，每隔14天噴一次，連續三次。 | 施藥時如有抽穗蔗株，果房應先行套袋，以免藥害發生。本藥劑試驗時加展著劑(Agral 90) 1500倍。具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。對水生生物具毒性，勿使用於「飲用水取水口一定距離內之地區」。 |
| | 依普克敏 | 總殺 | G1/C3 | ✓ | P/C | 3 | 發病初期施藥，藥劑加水至30公升/公頃，以動力微粒噴霧器將藥劑噴射於香蕉心葉及其他葉片，每隔14天噴一次。 | 蔗株如果有果房應先行套袋，不可噴施於果房。具口服中等毒，具輕微眼刺激性及中度皮膚刺激性。對水生生物具毒性，勿使用於飲用水取水口一定距離內之地區。 |
| | 白克列 | 威力旺/好威力 | C2 | 局部 | P/C | 6 | 以動力微粒噴霧器將藥劑噴射於香蕉心葉及其他葉片，每隔14天噴一次，連續三次。 | 具呼吸中等毒性。 |
| | 待克利 | 農好強/巧是猛 | × | ✓ | P/C | 6 | 以動力微粒噴霧器將藥劑噴射於香蕉心葉及其他葉片，每隔14天噴一次。 | 施藥時如有抽穗蔗株果房應先行套袋，以免藥害發生。對水生生物劇毒。 |
| | 環克座 | 天王/天神 | G1 | ✓ | P/C/E | 15 | 以動力微粒噴霧器將藥劑噴射於香蕉心葉及其他葉片，每隔14天噴一次，連續四-五次。 | 本藥劑試驗時每公頃加展著劑(SANDOVIT) 100公撮。 |
| 葉斑病 | 比芬諾 | 治粉寶/粉粉寧 | × | ✓ | P/C | 6 | 以動力微粒噴霧器，每隔14天噴一次，連續四-五次。 | 本藥劑試驗時每公頃加展著劑 Sando vit 100公撮。 |
| | 鉅錳乃滿 | 萬生/興農生 | M | × | P | 6 | 以動力微粒噴霧器，將藥劑噴射於香蕉心葉及其他葉片，每隔10至14天噴藥一次，連續七至八次。 | |
| | 滅特座 | 立特座 | G1 | 局部 | 7 | 發病初期開始施藥，每隔21天施藥一次，連續三次。施藥時將藥劑加水至30公升，以微粒動力噴霧機將藥液噴施於心葉及其他葉片上。 | 具呼吸中等毒及嚴重眼刺激性。對水生生物具毒性，勿使用於飲用水取水口一定距離內之地區。 | |
| | 四氣真茶醇 | 達克靈/露露 | M | × | P | 14 | 本藥劑不可加展著劑及混合礦物油使用，以免發生藥害。 | |
| | 鉅錳乃滿 | 萬生/興農生 | M | × | P | 30 | | 本藥劑不可加礦物油。本藥劑調配後，再加已用水稀釋之展著劑「出來達」AE 400倍。 |
| 普克利 | 特利得/上等讚 | G1 | ✓ | P/C | 6 | 每三星期噴一次，繼續噴二至五次。 | 本藥劑不可加礦物油。 | |